

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 07/08/2014

## Dénomination du médicament

**CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée**  
**Podophyllotoxine**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée ?
3. Comment prendre CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée ?
6. Informations supplémentaires.

### **1. QU'EST-CE QUE CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### **Classe pharmacothérapeutique**

ANTIVIRAUX  
(D: Dermatologie)

#### **Indications thérapeutiques**

Ce médicament est destiné au traitement des verrues génitales et péri-anales (végétations des organes génitaux externes ou zones atteintes autour de l'anus, provoquées par un virus).

Le mécanisme d'action de ce médicament conduit à la destruction des verrues génitales et péri-anales dans un délai de 2 à 5 semaines.

Au cours du traitement la verrue génitale devient sèche et crouteuse, puis disparaît.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée ?**

## Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

## Contre-indications

**N'utilisez jamais CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée dans les cas suivants:**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée ([vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6](#)) ;
- Si vous utilisez déjà une autre préparation contenant la même substance active que CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée (la podophylotoxine) ;
- Si vous êtes une femme enceinte ;
- Si vous êtes une femme qui allaite ;
- Chez un enfant.

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée:**

- Evitez d'appliquer CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée sur des zones de peau relativement étendues.
- Evitez de mettre en contact la solution avec les yeux sous peine d'irritation sévère. Si la solution est entrée en contact avec vos yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Si vous appliquez CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée par accident sur une peau saine ou sur les muqueuses avoisinantes à la verrue, une irritation cutanée et/ou ulcération peuvent apparaître. Ces effets peuvent être évités en appliquant avant le traitement une couche protectrice de crème neutre (vaseline ou pommade à base de zinc) autour de la verrue génitale ou péri-anale.
- Au cours du traitement la verrue génitale ou péri-anale devient sèche et croûteuse, puis disparaît. Comme elle est d'origine virale, il faut détruire la totalité des lésions pour éviter les récurrences.

## Interactions avec d'autres médicaments

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### Grossesse et allaitement

Vous ne devez jamais utiliser CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée si vous êtes une femme enceinte ou si vous allaitez.

Avant d'être traitée par CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée, informez votre médecin si vous êtes enceinte, pensez l'être ou si vous allaitez. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser des méthodes appropriées

de contraception. Si vous envisagez une grossesse, parlez-en d'abord à votre médecin.

En cas de début d'une grossesse sous CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée, arrêter le traitement et contactez immédiatement votre médecin. Votre médecin décidera avec vous, si vous continuerez votre traitement ou non.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Sportifs

Sans objet.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

### Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés. Cependant, compte-tenu de son usage local, à la posologie recommandée, il semble peu probable que Condylina ait un effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

## Liste des excipients à effet notoire

### Informations importantes concernant certains composants de CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée :

En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse cutanée.

## 3. COMMENT UTILISER CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée ?

### Instructions pour un bon usage

#### Quelques conseils avant d'utiliser CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée

- CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée est utilisé en usage externe uniquement.
- L'efficacité de CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée peut entraîner vers le 2<sup>ème</sup> ou le 3<sup>ème</sup> jour du traitement une inflammation modérée de la zone traitée (rougeur, douleur légère, irritation). Si la douleur ou la gêne vous semble importante, n'hésitez pas à contacter votre médecin.

#### Comment faire pour éviter de contaminer votre entourage ?

- Les verrues génitales et péri-anales sont contagieuses. Un flacon ne doit servir qu'au traitement d'une seule personne.
- Les verrues génitales et péri-anales sont contagieuses; utilisez systématiquement un préservatif tant que votre médecin ne vous aura pas confirmé la guérison complète des lésions.
- Afin d'éviter tout risque de contamination de votre entourage, réservez un linge de toilette uniquement à votre usage personnel.

#### Où appliquer CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée ?

- Utilisez uniquement CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée sur les lésions indiquées par votre médecin.
- N'appliquez pas CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée sur la peau saine ou les muqueuses avoisinantes ([voir également «Faites attention avec CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée»](#))

#### Comment utiliser CONDYLINE 0,5 %, solution pour application cutanée ?


1. Lavez-vous les mains.



2. Lavez la zone à traiter à l'eau et au savon, rincez et séchez délicatement.
3. Le flacon est muni d'un bouchon de sécurité. Pour l'ouvrir, placez-le sur un support rigide en le maintenant d'une main.
4. Appuyez fortement sur le bouchon vers le bas (A) et dévissez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (B).



5. Au moyen d'un des applicateurs fournis dans la boîte, déposez avec précaution le produit sur la verrue génitale ou péri-anales. Evitez d'en mettre sur la peau saine, ce qui pourrait provoquer une irritation.




6. Laissez sécher avant de remettre vos vêtements pour éviter que la solution touche accidentellement la peau saine. Ceci est particulièrement important pour les verrues génitales localisées sur le prépuce.
7. Si la verrue génitale ou péri-anales est dans un repli, écartez la peau avec les doigts et laissez sécher avant que la peau ne reprenne sa position normale. Si elle est difficile à atteindre, utilisez un miroir ou demandez l'aide d'une tierce personne.



8. Après utilisation, jetez l'applicateur.



9. Lavez-vous les mains.



10. Refermez le flacon normalement, sans manipulation particulière.

## Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

### Fréquence des applications

- Utilisez CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée seulement deux fois par jour. Il ne faut pas l'appliquer plus souvent.
- Si vous avez l'impression que l'efficacité n'est pas suffisante, n'augmentez pas le nombre ou la durée des applications. Prévenez votre médecin.

### Durée de traitement

- N'utilisez pas CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée plus de trois jours de suite.
- Trois jours de traitement doivent être suivis de quatre jours d'arrêt.
- Ce traitement peut être répété chaque semaine jusqu'à un maximum de cinq semaines si votre médecin l'indique.

## Symptômes et instructions en cas de surdosage

**Si vous avez utilisé plus de CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée que vous n'auriez dû :**

Utilisez toujours CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée comme votre médecin vous l'a indiqué.

Si vous avez accidentellement avalé ou si vous avez pris plus de CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée qu'il ne le fallait, consultez rapidement votre médecin ou votre pharmacien.

## Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

**Si vous oubliez d'utiliser CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

## Risque de syndrome de sevrage

**Si vous arrêtez d'utiliser CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée :**

N'interrompez en aucun cas le traitement sans avoir consulté un médecin.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Inflammation (rougeur, légères douleurs, œdème) au niveau de la zone traitée. Ces effets secondaires sont en général peu sévères et ne nécessitent pas l'arrêt du traitement.
- Irritation cutanée avec douleur ou rougeur et ulcération de la peau si la solution entre en contact avec la peau saine. Ces effets secondaires peuvent être évités ([voir la rubrique « Faites attention avec CONDYLINE 0,5%, solution pour application cutanée »](#)).

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la

sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER CONDYLIN 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

### Date de péremption

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte après {EXP}. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

### Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

### Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

#### Que contient CONDYLIN 0,5%, solution pour application cutanée ?

##### La substance active est:

Podophyllotoxine<sup>(1)</sup> ..... 0,50 g  
Pour 100 ml de solution.

(1): principe actif de la résine de podophylline extraite à l'alcool à partir de rhizomes séchés et des racines de la podophylline (*P. peltatum*, *P. emodi*).

##### Les autres composants sont:

Acide lactique, lactate de sodium, éthanol à 96% (v/v).

### Forme pharmaceutique et contenu

#### Qu'est-ce que CONDYLIN 0,5%, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée.

Flacon de 3,5 ml.

### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

#### Titulaire

**ASTELLAS PHARMA**  
26 QUAI MICHELET et 158 RUE DANTON  
92300 LEVALLOIS PERRET

#### Exploitant

**ASTELLAS PHARMA**  
26, quai Michelet  
92300 LEVALLOIS-PERRET

#### Fabricant

**ASTELLAS PHARMA EUROPE BV**

SYLVIUSWEG 62  
2333 BE LEIDEN  
PAYS BAS

#### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

#### **Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

#### **AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

#### **Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

#### **Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

#### **Autres**

Sans objet.